

Die

Lane Medical Library

Behandlung der Hernien

sonst und jetzt.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Professor

D^R. J. N. RITTER VON NUSSBAUM

k. b. Generalstabsarzt à l. s. etc.

der

medizinischen Facultät zu München

vorgelegt

von

J. Oswald Läuterer

approb. Arzt.

München, 1882.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München.

Die
Behandlung der Hernien
sonst und jetzt.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
unter dem Präsidium
des Herrn Professor
D^{R.} J. N. RITTER VON NUSSBAUM
k. b. Generalstabsarzt à l. s. etc.
der
medizinischen Facultät zu München
vorgelegt
von
J. Oswald Läuterer
approb. Arzt.

München, 1882.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

Motto:

„Tempora mutantur et nos mutamur in eis!“

In der Statistik der Leiden, bei welchen chirurgische Encheirefen in Anspruch genommen werden, stehen die Brüche weitaus voran und zwar sind es hiebei nicht nur die Chirurgen von Fach, deren Hilfe gesucht wird oder besser gesagt gesucht werden kann, sondern es ist oft der praktische Arzt zumal auf dem Lande, der jeden Augenblick bereit sein muß, auch ohne die kundige Hand eines geübten Assistenten hier eine lebensrettende Operation auszuführen. Denn gerade die schwer arbeitende Klasse ist es, welche das größte Contingent für die Brüche stellt, so daß man durchschnittlich annehmen kann, daß von 20 Individuen der arbeitenden Bevölkerung eines mit einem solchen Leiden behaftet ist und es ließe sich entsprechend den größeren Anforderungen an die Arbeitsleistung des Mannes das Verhältniß zum weiblichen Geschlechte wie 4:1 aufstellen.

Der chirurgische Eingriff nun, welchen der Arzt bei einer solchen Gelegenheit unternimmt, kann für den betreffenden Kranken entweder zum größten Vortheil, ja sogar zur gänzlichen Befreiung von seinem Uebel gereichen, oder er kann denselben in die höchste Lebensgefahr bringen oder denselben selbst das Leben kosten. Und hier ist es, wo die Neuerung, welche auf dem Gebiete der operativen Chirurgie seit der großen und bedeutungsvollen Reformbewegung durch Lister

fast keinen Theil unverändert gelassen hat, auch einen gewaltigen Umsturz der Handlungsweise und des daraus erfolgenden Resultates zu verzeichnen hat.

Bevor wir jedoch näher auf die verschiedenen Verfahren und Operationsmethoden übergehen, welche man zur Beseitigung dieses gefährlichen Uebels früher in Anwendung zog, und auf diejenigen, welche man jetzt im Gebrauch hat, ist es jedenfalls gerechtfertigt, zuerst einen kleinen Ueberblick über die pathologisch-anatomischen Verhältnisse dieses Leidens zu geben.

Unter Bruch (*hernia* von ἑρνος Zweig — κήλη ursprünglich eine brennende hitzige Geschwulst) versteht man in der Chirurgie jene angeborene oder acquirirte Lageveränderung eines Eingeweidcs, in Folge deren sich dasselbe nicht in seiner naturgemäßen Körperhöhle befindet, sondern aus derselben nach auswärts getreten, dabei jedoch noch von der äußern Haut bedeckt ist, was bei dem den Brüchen ähnlichen Vorfalle (*prolapsus*) nicht der Fall ist, indem bei letzterem die äußere Bedeckung durch Berstung, Verletzung u. s. w. eine Continuitätstrennung erfahren hat und so der vorgetretene Theil den Einwirkungen der Luft ausgesetzt wird. Wir können die Brüche, welche seltener dem Arzte zu Gesicht kommen und niemals Objekt eines chirurgischen Eingriffes werden, übergehen: nämlich den Hirnbruch (*Encephalocele*) und den Zwerchfellbruch (*hernia diaphragmatica*, *diaphragmatocele*), und wenden uns zu den Unterleibsbrüchen, für deren Ueberwiegen schon der Umstand ein Zeichen ist, daß man unter Bruch in der Regel nur Unterleibsbrüche versteht. Diese erhalten nun wieder je nach dem Eingeweide, welches ausgetreten ist, je nach ihrem Sitz, der Zeit ihres Auftretens oder ihres eigenthümlichen Verhaltens verschiedene Benennungen und Eintheilungen. Je nach den Eingeweiden, die im Bruchfacke enthalten sind, nennt man einen Bruch einen Darmbruch (ἐντεροκήλη), einen Netzbruch (ἐπιπλοκήλη), einen Darmnetzbruch (ἐντερο-ἐπιπλοκήλη), einen Magenbruch (γαστροκήλη), einen

Blasenbruch (κυστοκήλη), einen Gebärmutterbruch (ὄστεροκήλη), einen Eierstocksbruch (οὐφороκήλη).

In Berücksichtigung auf den Ort unterscheidet man einen Leistenbruch (*hernia inguinalis*), einen Schenkelbruch (*hernia cruralis seu remoralis*), einen Bruch der weissen Linie bei Diafatafe der musculi recti (*hernia lineae albae*), einen Bruch des eirunden Loches (*hernia foraminis ovalis seu h. obturatoria*), einen Hüftauschnittbruch (*hernia perinealis*), einen Mastdarmbruch (*hernia rectalis*) einen Darmbruch (*hernia perinealis*), einen Scheidenbruch (*hernia vaginalis*).

Ein Bruch kann angeboren sein und zeigt sich dann also schon bei dem Neugeborenen gleich nach der Geburt oder wenige Tage nachher (*hernia congenita*). Er kann aber auch durch Einwirkung irgend welcher äusserer schädlicher Momente auf Individuen, die durch die anatomischen Verhältnisse hiefür prädisponirt sind, erworben werden (*hernia acquisita*).

Ein Bruch kann nun ferner, welch' ein Eingeweide er auch immer enthalten möge, durch die Austrittsöffnung bei geeigneter Lagerung und entsprechendem diätetischen Verhalten entweder von selbst wieder in die Unterleibshöhle zurücktreten oder doch wenigstens durch verschiedene Handgriffe mit grösserer oder geringerer Leichtigkeit dahin zurückgebracht werden (*hernia mobilis*, *hernia reponibilis*), oder letzteres ist nicht durch obige Mittel zu erreichen (*hernia irreponibilis*). Nicht reponibel sind Hernien aus drei Gründen: entweder weil sie incarcerirt sind (*hernia incarcerata seu strangulata*), wobei dieselbe in der Gegend der Austrittsöffnung durch die Contraktion der umgebenden Muskeln, derartig eingeschnürt wird, dass dadurch der Inhalt des Darmstückes oder die Circulation des Blutes in den Gefässen gehindert oder vollständig gehemmt ist; oder weil sie verwachsen sind, wo jedoch ausser der Unbequemlichkeit, welche jeder Bruch an und für sich schon für den Patienten mit sich bringt, keinerlei anderweitige bedrohliche Erscheinungen für

den Moment veranlaßt werden; oder endlich sind Brüche nicht reponibel, weil sie zu groß sind. Ist nemlich eine Art Ex-ventration geschehen, so hat sich der Leib ganz zusammengezogen und hat nicht mehr Raum genug, die Gedärme aufzunehmen.

Fragen wir nun nach den ätiologischen Momenten, welche dieses Leiden hervorrufen, so ist zunächst die Thatfache festzuhalten, daß für die Entstehung eines Bruches ein gewisser locus minoris resistentiae bestehen muß, und dieser ist geboten in einer Anzahl von Oeffnungen in den Bauchwänden, welche im fötalen Leben Kanäle darstellen, die zur Zeit der Geburt bereits verschlossen sein sollten. Nun ereignet es sich aber, daß derartige Oeffnungen beim Beginn des extrauterinen Lebens entweder offen persistiren oder wenigstens nicht in einem solchen Grade ihren Verschluss erlangt haben, daß sie dem Drucke der Bauchpresse und dem Andrang der Eingeweide den nöthigen Widerstand zu leisten vermöchten. Die Brüche entstehen also nach diesen Voraussetzungen auf eine mechanische Weise (Drucktheorie) und zwar selten mit einem Male, sondern in der Regel allmählig in der Weise, daß zuerst das Peritonäum und dann die Eingeweide hervorgedrängt werden und herabtreten.

Einen weiteren günstigen Faktor für die Entstehung einer Hernie bietet die Schlaffheit des fibrösen Gewebes, die Dehnung der Bauchwände durch Ascites, Schwangerschaften, hochgradige Fettleibigkeit, wodurch, wenn eine rasche Abnahme der bestehenden Dehnung eintritt an gewissen Stellen des Unterleibes wieder Oeffnungen erzeugt werden, welche vorher verschlossen waren. Als begünstigende Ursache wirkt dann starke und oft wiederholte Anstrengung der Bauchpresse, wie dies namentlich bei Kindern der Fall ist, die viel schreien oder an Pertussis oder einem andern krampfhaften Husten leiden, weiters das Tragen und Heben schwerer Lasten besonders bei schiefen Ebenen, angestrengte und langandauernde Athem-

bewegungen, wie solche beim Steigen, Turnen, Bergtouren, Spielen von Blasinstrumenten, sowie bei gewissen chronischen Krankheiten des Respirationstraktus, dem chronischen Bronchialkatarrh und dem Emphysem nöthig wird, ferner bei Stuhl- und Urinentleerung, wie dies bei pathologischen Veränderungen der betreffenden Organe — Strikturen, Blasensteinen u. f. f. — eintritt und endlich bei starker Erschütterung des Unterleibes beim Springen, Reiten, durch einen Stofs, Schlag oder irgend ein anderes Trauma auf den Unterleib. Doch, wie schon angedeutet, entstehen bis auf ganz wenige Ausnahmen Hernien nach solchen schädlichen Einwirkungen nie ganz plötzlich, so dafs die betreffenden Personen angeben, auf einmal einen schmerzhaften Ruck empfunden zu haben, sondern man neigt sich in neuerer Zeit auf Grund der schönen Untersuchungen von Linhart und Roser zu der Ueberzeugung hin, dafs die Brüche nach und nach entstehen, indem das Primäre immer die Bildung eines ganz kleinen Bruchsackes ist. In diesen vorgebildeten Bruchsack würden dann sekundär unter Mitwirkung der weiter oben angeführten schädlichen Gelegenheitsursachen die Eingeweide allmähig oder mit einem Ruck hineingeprefst werden. Den Bruchsack denkt man sich nach dieser Theorie entstanden durch den Zug eines Fettklümpchens durch Divertikelbildung beim Schwund einer Lymphdrüse des subperitonealen Fettgewebes im höheren Alter, nach schweren Krankheiten etc. Von der Präexistenz eines Bruchsackes hat man bei der Untersuchung von Leichen oft Gelegenheit sich zu überzeugen (Zugtheorie).

Anatomisch constituirt sich ein Bruch aus dem Bruchsack und dem Bruchsackinhalt, wozu noch die Oeffnung kommt, durch welche der Bruch austritt, die Bruchpforte. Die accessoirischen Hüllen des Bruches werden von Haut, Fett, Fascien, Muskelfasern u. f. w. gebildet.

Der Bruchsack ist das ausgestülpte parietale Blatt des Peritoneums, das jedoch, wenn der Bruch schon eine längere

Zeit hindurch bestanden hat, seines ursprünglichen Charakters verloren gegangen ist, allmählig durch äussere bindegewebige Ablagerungen eine Verdickung erfährt, während andere Stellen hinwiederum so dünn sind, dass Zerreissung und Austritt der Eingeweide stattfinden kann.

Der Bruchinhalt besteht aus dem vorgetretenen Darmstücke nebst Mesenterium oder aus Netz und Darm, die von einer serösen Flüssigkeit umgeben sind, dem Bruchwasser, das in verschiedenen Mengen sich vorfindet und nur dann fehlt, wenn in Folge chronischer Entzündung die serösen Flächen des parietalen und visceralen Blattes des Peritoneums resp. des Bruchsackes und des Darmstückes eine Verwachsung erfahren haben. Von dem Darm befindet sich anfangs nur eine Schlinge im Bruchsacke und erst bei grober Vernachlässigung treten immer mehr und mehr Eingeweide herab, bis es schliesslich zu einer vollständigen Exvagination kommt.

Der Darm im Bruchsack geht, falls er längere Zeit innerhalb desselben gelegen hat, mehr oder weniger erhebliche Veränderungen ein, zunächst am Mesenterium. Dieses wird gedehnt, verliert seine Elasticität, daher oft mechanische Störungen durch Achsendrehung, Knickungen u. s. w. Dies kann auch noch nach Reposition des Darms in die Bauchhöhle stattfinden. Abgelenkt wird er an den Ein- und Austrittsöffnungen in und aus der Pforte des Bruches. Es kommt ziemlich häufig auch zu adhäsiver auf Bruchsack und seine Contenta localisirter Peritonitis. Dadurch aber entsteht Verwachsung der Intestina unter einander oder mit dem Bruchsack.

Wohl zu beachten sind auch die sogenannten Litter'schen Brüche, bei denen nur eine Wand des Darmes oder auch nur ein kleines divertikalartiges Stück des confexen Darmes eingeklemmt ist. Kocher hat kürzlich die Frage der Litter'schen Brüche auf Grund von Beobachtung und Experiment besprochen. Er konnte eine Füllung des in eine enge Bruchpforte gezogenen Darmabschnittes nur zu Stande bringen, wenn die Spitze der

Schlinge fixirt war, außerdem zog sich bei Füllung der kleinen Tasche diese von selbst aus der Einklemmung heraus. Der Mechanismus zur Entstehung einer wirklichen Stenose ist beim Litter'schen Bruch so zu denken, daß zunächst Füllung des fixirten Darmwandbruches eintritt und dann durch das Hereinziehen von Schleimhaut in den Bruchfack der Darm so verengert wird, daß eine Stenose entsteht (Busch). Am meisten Veränderung erleidet vom Bruchinhalt das Netz. Dasselbe wird hypertrophisch, derb und bildet zuletzt einen unförmlichen vielfach mit dem Bruchfack verwachsenen Klumpen, der sich nicht mehr in die Bauchhöhle zurückschieben läßt.

In der Regel ist die Diagnose eines Bruches durch die Anwesenheit eines Tumors an den betreffenden Bauchöffnungen sehr leicht und wird häufig schon von den Laien gestellt. Diese Geschwulst tritt bei jeder Anstrengung der Bauchpresse ruckweise mehr hervor und geht bei horizontaler Rückenlage des Kranken, besonders wenn dabei ein gleichmäßiger Druck auf sie ausgeübt wird, in die Bauchhöhle zurück oder kann wenigstens durch günstige Lagerung des Patienten, durch welche man das Einwirken der Bauchpresse zu eliminiren sucht und durch passende Handgriffe (Taxis, Repositio) wieder in die Bauchhöhle zurückgebracht werden, wobei man, wenn es sich um einen einfachen Darmbruch handelt, ein glucksendes Geräusch wahrnimmt. Eine einfache Hernie ist also nachgewiesen, wenn die Geschwulst tympanitisch klingt, sich bei der Wirkung der Bauchpresse (Husten, Drängen und Aehnlichem) vergrößert und reponirt werden kann. Nach der Reposition bleibt ein schlaffer Sack zurück, der zwischen zwei Fingerspitzen gewalkt die glatte Innenfläche einer Scrofa erkennen läßt, also der Bruchfack ist. Endlich kann man die Decken einstülpen und mit den Fingerspitzen in einen Kanal, selbst bis in die Bauchhöhle eindringen. Bei den eingeklemmten irreponiblen Hernien aber ist der Bruch einmal nicht zurückzubringen und die Geschwulst ist am Halse und in der Nähe der

Bruchpforte schmerzhaft, dann treten Abdominalsymptome auf, Meteorismus, kolikartige Schmerzen um den Nabel, Erbrechen, zuerst von Mageninhalt, später gallige Flüssigkeit, endlich fäculent riechender Darminhalt, öfter auch wirkliches Miserere. Dies tritt erst nach längerer Dauer der Einklemmung auf, daher ist ein wichtiges Zeichen der Undurchgängigkeit, daß keine Winde abgehen. Endlich kommen dazu noch Allgemeinerscheinungen: Angst, Pulsbeschleunigung, Schwäche, Verfall des Gesichts, schließlich Tod in Folge von Erschöpfung.

Das Augenmerk bei der Behandlung irreponibler erwachsener Hernien, um deren Beseitigung und ev. Heilung es sich im vorliegenden Falle handelt, muß nicht nur allein darauf gerichtet sein, diesen bedenklichen Zustand zu verbessern und das bedrohte Leben des Leidenden zu retten, sondern der Arzt muß auch, wenn er wirklich Erfolg haben will, alles vermeiden, was Veranlassung werden könnte, solche Brüche herbeizuführen und deshalb gehören hieher auch alle jene Operationen, welche den Zweck haben, eine Radicalheilung der Brüche überhaupt zu bewirken. Es hat an den verschiedenartigen Anstrengungen, eine Radikalkur zu erfinden, nicht gemangelt. Das ist leicht erklärlich, denn schon eine *hernia mobilis* ist für den Träger insofern eine stets drohende Gefahr, als sich dieselbe zu jeder Zeit einklemmen und dadurch den Betreffenden in das höchste Unglück bringen kann. Wird er durch ein passendes, gut anliegendes elastisches oder unelastisches Bruchband zurückgehalten, so sind die Gefahren und Beschwerden im Allgemeinen gering, die Leute können ihren gewöhnlichen Beschäftigungen nachkommen, ja viele Menschen verrichten mit einem durch ein Bruchband zurückgehaltenen Bruch die schwersten Arbeiten, wenn auch freilich heftige Anstrengungen zu vermeiden sind. Wird aber kein Bruchband getragen, so erweitert sich nach und nach die Bruchpforte und der Hals des Bruchfackes, immer mehr Eingeweide treten in den Sack, welche dann, wie schon erwähnt, unter sich oder

mit dem Bruchfack verwachsen können. Es sind zwar hiebei die Gefahren der Einklemmung verhältnißmäßig gering, allein es kommt zu Erscheinungen von andauernden Verdauungsstörungen (Flatulenz, Obstipation) und wenn sich viel Koth innerhalb der Darmtheile im Bruchfack anstaut, kann es zumal nach Genuß schwer verdaulicher Speisen zu gehinderter Fortbewegung des Inhaltes kommen, zu Verstopfung, Erbrechen u. dgl. mehr. Wird nicht operirt, so steigern sich diese Erscheinungen bis zur wirklichen Einklemmung (Kotheinklemmung). Außer dieser Gefahr droht bei großen Brüchen auch die einer Peritonitis im Bruchfacke. Die dadurch zurückbleibenden Verwachsungen haben leicht Verschlingungen zur Folge, welche wiederum zu einer inneren Verschlingung des Darmes führen können. Auch sind die großen Geschwülste, die bis zu den Knien und weiter reichen können, den damit Behafteten sehr lästig.

Anders verhält sich die Sache bei den irreponiblen Brüchen, bei denen entweder wegen Veränderung des Bruchinhaltes, nämlich Verdickung der Wände, Vergrößerung des hervorgetretenen Netzes, durch Fettablagerung, Cystenbildung u. s. w., oder wegen Verwachsungen oder Exvagination eine taxis sich gar nicht oder nur theilweise ausführen läßt, durch welchen Umstand das Tragen eines Bruchbandes für die Mehrzahl der Fälle auf die Dauer unmöglich gemacht wird. Derartige Kranke stehen natürlich fortwährend in größter Lebensgefahr, indem bei ihnen öfters der Einklemmung ähnliche Symptome auftreten, obgleich die wahre Incarceration bei dieser Art von Brüchen selten zur Beobachtung kommt. Es ist die Anhäufung von Kothmassen, welche bei dem Kranken kolikartige Schmerzen und meteoristische Erscheinungen hervorruft. Der hauptsächlichste Grund hiefür ist der, daß der Darm, welcher in seiner peristaltischen Bewegung längere Zeit gehemmt ist, allmählig die Bewegungsfähigkeit überhaupt in Folge des Schwundes seiner kontraktilen Muskelfasern einbüßt. Auch fremde Körper,

Kirschkerne u. f. w., welche in ein so verändertes Darmstück gelangen, können leicht dort liegen bleiben und eine so starke entzündliche Reizung dafelbst bewirken, daß es schließlich zum Durchbruche des Darmes kommt. Natürlich ist es bei diesen Brüchen dringlichst geboten, sobald wie möglich Abhilfe zu schaffen. Die Taxis, wie sie bei beweglichen Brüchen zur Anwendung kommt, führt nie zum Ziel, es bedarf vielmehr längerer Zeit, Wochen und selbst Monate lang, während derer der Patient ruhig in horizontaler Rückenlage ausharren muss, bis der Darm für die Zurückbringung zugänglich wird, unterstützt durch passende Diät, Anwendung von Kälte und adstringirenden Umschlägen. So gelingt es denn auch nach wiederholten Versuchen den Bruch zu operiren und durch ein passendes Bruchband die Retention zu sichern.

Dies Verfahren wäre allerdings ein sehr angenehmes und rationelles, allein seiner Ausführung stellen sich oft unüberwindliche Hindernisse in den Weg. Vor allem ist es die soziale Stellung des Kranken, welche eine solche Kur unmöglich macht. Es wurde bereits angegeben, daß Brüche hauptsächlich bei der schwer arbeitenden Bevölkerung vorkommen und diesen, welche darauf angewiesen ist, von ihrem Erwerbe sich und ihre Familie zu erhalten, kann füglich durch die angegebene Methode nimmermehr Heilung verschafft werden. Aber auch, wenn die Lebensstellung diese Art der Heilung erlauben würde, so wäre es immerhin wegen der Länge der Dauer und der damit verknüpften Unbequemlichkeiten ein Verfahren, zu dem sich wohl die wenigsten Patienten verstehen können werden.

Man kann noch in unserer Zeit fast täglich in einer Zeitung ein radical wirkendes Mittel gegen die Brüche angepriesen finden und, wie es jetzt immer noch unverständige Leute gibt, welche in Unkenntniß der anatomisch vorliegenden Verhältnisse ihr gutes Geld für irgend eine Schwindelwaare hingeben, so war es und zwar in viel höhern Grade früher der Fall.

Eine Unmasse von Pflastern, Salben, von Säckchen, welche mit besonders heilsam sein sollenden Ingredienzien gefüllt waren, wurden von herumziehenden Marktschreibern und Quackälbern den armen Bruchbehafteten aufgeschwindelt, ja man kam sogar soweit innerliche Mittel zu verabreichen, die zusammenziehend wirken und dadurch den Bruch zum Schwinden bringen sollten. Welche Ungeheuerlichkeiten hiebei vorgekommen sein mögen, kann man sich leicht denken, wenn man erwägt, daß *acidum muriaticum* als adstringirendes Mittel zur Radicalheilung der Brüche ordinirt wurde.

Man hat sich von jeher viel Mühe gegeben eine Radicaloperation der Hernien zu erfinden, jedoch waren leider die geistreichsten Operationen in der Mehrzahl der Fälle erfolglos, da nach Eröffnung des Peritoneums sehr häufig Peritonitis mit letalem Ausgang eintrat. Erst seitdem man kennen gelernt hat, daß nicht die Verletzung des Peritoneums die Ursache jener unglückseligen Resultate ist, sondern die Infektion, welche in der Wunde stattfindet, und seitdem man durch Lister's geniale Erfindung diesen Feind zu bewältigen im Stande ist, erst seit dieser Zeit kann man und zwar mit voraussichtlich dem besten Erfolg an eine Radicalheilung der Hernien schreiten.

Zu den allerältesten Verfahren auf operativem Wege eine Radicalheilung der Hernien zu bewerkstelligen, gehören diejenigen, welche eine offene Wunde setzten und dabei den Bruchsack sammt den angrenzenden Theilen entfernten (Castration) oder zuerst um den Bruchsack eine Ligatur anlegten und ihn allein fortnahmen, wodurch Hoden und Samenstrang gleichont werden sollten. Die Castration war bei der Klasse der herumziehenden Bruchschneider traditionell und bis in das 18. Jahrhundert herübergekommen.

Wenn man bedenkt, wie roh und gewalthätig bei dieser Operation im Vergleich zur jetzigen Zeit zu Werke gegangen wurde, so muß man sich wundern, daß die Mehrzahl der Operirten überhaupt genasen und zum kleinern Theil wohl

auch von ihrem Leiden befreit blieben. Es zählte der Bischof zu Breslau zur damaligen Zeit 500 Kinder und 200 Erwachsene, an denen diese Operation ausgeführt worden war. Erst gegen das Ende des 18. Jahrhunderts wurden in Frankreich gesetzliche Bestimmungen gegen diese Operation wegen der durch sie veranlassten Verstümmelung erlassen. Allein darüber ist kein Zweifel, daß die Castration ein vortreffliches Mittel ist einen reponirten Bruch zurückzuhalten. Wenn die Castration noch neben einer andern Radicaloperation ausgeführt wird, so wird durch die Castration das glückliche Resultat der Radicaloperation nahezu ganz gesichert, da sich die Narbe der radical operirten Hernie mit dem Samenstrang tief in den Leib zurückzieht.

Die Unterbindung des Bruchfackes wurde schon von Paulus v. Aegina im 7. Jahrhundert, von Abul Kasim el Zahawi gestorben 1106 und Roger v. Parma im 15. Jahrhundert geübt, ist jedoch von der Castration in ihrer Wirkungsweise eigentlich wenig verschieden, weil der Samenstrang mit in die Ligatur gefaßt wurde.

Eine andere Methode die Hernien zu heilen, war die Compression und diese war in ihrer Wirksamkeit schon den Römern bekannt. Celsus*) nemlich schlägt sie bei Knaben vor und gibt an, daß dabei oft eine Verwachsung der ferösen Haut zu Stande komme.

Er verwendet zu diesem Zwecke ein Bruchband, bestehend aus einer Binde, welche an ihrem Ende eine Pelotte trägt, die aus Tuch verfertigt ist und welche auf den Leistenkanal zu liegen kommt. Der übrige Theil der Binde wird dann in straffen Touren angelegt. Bei höherem Lebensalter und bei Incarceration konnte man von diesen Verfahren keinen Gebrauch machen und, da man die Gefahren sehr wohl kannte; welche ein operativer Eingriff im Gefolge hatte, so versuchte

*) A. C. Celsus de medicina liber VI. caput XX. XXI.

man, bevor man sich zu einer solchen Behandlung entschloß, durch anderweitige Regimen das Leiden zu heben. Es wurde eine Venäsektion gemacht und drei Tage lang eine vollständige Enthaltung der Speisen angedordnet oder wenigstens solange, als es die Kräfte des Kranken erlaubten. Während dieser Zeit wurde ein Kataplasma von einer Emulsion aus Leinfamen, Gerstenmehl, Harz und Oel auf die Geschwulst gelegt. Manche Aerzte gaben auch Abführmittel, gegen welche sich jedoch Celsus mißliebig ausspricht, weil nach seiner Ansicht dadurch etwas in's Scrotum hinein- aber nicht mehr herausgebracht würde.

Dieses Verfahren wurde so oft wiederholt, als die Indication dazu vorlag.

Wenn nun all' diese Mittel im Stiche liefen, so wurde zur Operation geschritten. Es wurde dann durch einen Hautschnitt vom Leistenkanal bis herab zum Scrotum der Bruch frei gelegt und der Bruch sack excidirt, wobei der Hoden erhalten blieb. Bei einem Netzbruch wurde ebenso ein Einschnitt in der Leistenengegend gemacht und hiebei dann darauf Rücksicht genommen, ob ein kleiner oder großer Theil herabgetreten war. War nur ein kleiner Theil herabgetreten, so wurde derselbe entweder mit dem Finger oder einer spatelartigen Sonde in die Abdominalhöhle zurückgebracht, war es aber ein größerer Theil, so stand man von der Taxis ab und bestrich das herabgetretene Stück mit Aetzmitteln, so daß dann Gangrän und Abstoßung erfolgte. Manche legten bei diesem Fall auch eine Ligatur an und dies geschah in der Weise, daß sie durch das Netz mit einer Nadel einen doppelten Faden von Leinen führten und immer je zwei Enden derselben nach den entgegengesetzten Seiten knüpften, so daß dadurch eine Abstoßung erfolgte, die gleichmäßig, wenn auch langsam vor sich ging. Beschleunigen ließ sich dieser Prozeß durch Anwendung fäulnißerregender Mittel. Wieder andere Aerzte schnitten das Netz mit einer Scheere ab, ein Verfahren, das

nicht von Allen gebilligt wurde, weil man es bei kleinen Theilen für überflüssig erklärte, während man bei großen Netzstücken wegen der darin enthaltenen großen Blutgefäße die profuse Blutung zu sehr fürchtete, als daß man dies Verfahren angewendet hatte. Dies war die Behandlungsweise zu Zeiten des Celsus.

Die arabischen Aerzte, welche überhaupt große Freunde vom *ferrum candens* und ähnlichen Mitteln waren, operirten auch im vorliegenden Falle nicht anders. Sie kauterisirten den Bruchfack.

Die Abtrennung eines Theiles des Bruchfackes durch die sogenannte königliche Naht verringerte wenigstens in etwas die Gefahren der eitrigen sich auf das Peritoneum fortsetzenden Entzündung. Man hob nach Freilegung des Sackes eine Längsfalte und steppte diese durch eine Naht vor dem kleinen Rest des Sackes ab. Das abgesteppte Stück wurde vor der Naht weggeschnitten.

Mit Ambrosius Parè geb. 1517, gestorben 1590, jenem berühmten Leibarzte von 4 französischen Königen, jenem allbekannten Reformator der gesammten damaligen Chirurgie wurde auch hier eine günstige Neuerung eingeführt. Er gab an, auf welche Weise man die Compression des *funiculus spermaticus* verhindern könne. Sein Verfahren errang sich in der chirurgischen Welt großen Beifall und eine solche Anerkennung, daß obgleich Jean Louis Petit (geb. 1674 gest. 1750), der bedeutendste Chirurg nach Parè die Operation als schwierig und gefährlich bezeichnete, doch alle großen Chirurgen bis in unser Jahrhundert herein, wie: Heuermann, Schmucker, Ohle u. C. J. M. Langenbeck daselbe in Anwendung brachten und zwar mit bedeutenden Erfolgen. Die Operation nach Ambrosius Parè wurde in folgender Weise ausgeführt:

Der Bruchfackhals wurde an seiner ganzen Ausdehnung lospräparirt und hierauf eine Ligatur um denselben gelegt. War es der Fall, daß die Hernie irreponibel war, so mußte

man selbstverständlich zuerst den Bruchfack eröffnen und die Hernien zurückbringen, ehe man die Ligatur anlegte. War dies geschehen, so wurde der Bruchfackkörper abgeschnitten und weggeworfen, während der Hals mit der Ligatur in den Kanal zurückgeschoben wurde.

Zu gleicher Zeit wurde von anderen Operateuren das Verfahren so modifizirt, daß die Ränder des Bauchringes oder des Kanales mit oder ohne Wundlücken des Bruchfackes durch Suturen vereinigt wurden. Die Nähte blieben alsdann solange liegen, bis dieselben durch den entstandenen Eiterungsprozeß abgestoßen wurden. In neuerer Zeit wurde die Operationsmethode durch James Wood wieder aufs Neue angewendet, doch mit der Veränderung, daß dieser Operateur beabsichtigte, die Metallnähte, welche die Pfeiler des Bauchringes vereinigten, mit einheilen zu lassen.

Bis zum Jahre 1876 finden sich in der Literatur 173 Fälle, von denen 171 Heilungen und zwei Todesfälle angegeben sind.

Dzoudi, Jameron, Rothmund u. A. versuchten bei ihren Herniotomien organische Lappen in die Bauchöffnung einzuheilen. Doch es zeigte sich, daß der Erfolg all' dieser Operationen durchaus nicht den gehegten großen Erwartungen entsprach.*)

Mit ebenso wenig gutem Endresultate wurde von englischen Chirurgen die Methode von Gangerot und Petit ausgeführt, nemlich den Bruchfack in die Bruchpforte einzustülpen. Da man glaubte, annehmen zu müssen, daß eine Ausfüllung des Bruchkanals durch Granulationen nach einer Herniotomie zu dauerndem Verschluss und somit zur Radicalheilung führen müsse, so bemühte man sich bis in die neuere Zeit her, durch Einführung fremder Körper in den geöffneten Bruchfack Eiterung und im Anschluß daran Granulationsbildung

*) König, Lehrbuch der speziellen Chirurgie II. Berlin 1879.

zu erzeugen. Allein auch diese Methode hat sich nicht bewährt, da man die schlimmen Folgen der Pyämie und Septicämie nicht zu vermeiden wufste, welche auch die bestausgeführten Operationen nutzlos machten, so zwar, daß manche Operateure auf das Messer ganz und gar verzichteten und die Operation so weit es ging, subcutan machten. Es wurden dann ferner auch viele Verfahren zur Radicalheilung der Hernien vorgeschlagen, deren Wesen darin beruhte, daß man durch Reizung eine Adhäsiventzündung im Bruchfacke zu erzielen und dadurch dessen Verödung herbeizuführen suchte. Hieher gehören die subcutanen Jodinjektionen, wie sie von Velpeaux, Jaubert und A. vorgeschlagen und ausgeführt wurden. Allein es stellte sich bald heraus, daß diese Jodinjektionen nicht so ungefährlich seien, indem man einerseits die Grenzen der resultirenden Entzündung niemals im Voraus sicher in der Hand hat, auf der andern Seite aber auch die im wirklich günstigen Falle entstandenen Granulationen doch keine Radicalheilung zu erzielen vermochten.

In ganz ähnlicher Weise macht Schwalbe subcutane Injektionen von einer 7% Alkohollösung in die Umgebung der Bruchpforte. Diese sollen 4—10mal mit je ein Ccm dieser Flüssigkeit wiederholt werden. Derselbe will in einem Falle von hernia umbilicalis, einem Falle von hernia lineae albae und einem solchen von hernia inguinalis eine radicale Heilung durch sein Verfahren gesehen haben. Die zum Schwund gebrachten Hernien waren sämtlich klein.

Um einen ähnlichen Reiz herbeizuführen erfanden Belmas Pirogoff und Bonnet ihre Verfahren.

Methode von Belmas:

Die ursprüngliche Form dieser Operation war die, daß man mit Hilfe eines eigens construirten Instrumentes in das Innere des Bruchfackes ein Säckchen aus Goldschlägerhaut einführte und dort aufblies, so daß dasselbe den Bruchfack ganz ausfüllte. Dadurch wurde einmal der Bruch zurückgehalten,

zum Andern aber wirkte dies als fremder Körper und die nun erfolgende Adhäsiventzündung bewirkte eine Obliteration des Bruchfackes. Da dieses Verfahren in seiner Ausführung schwierig ist, so wurde es durch Belmas selbst dahin abgeändert, daß er statt jenes Säckchens von Goldschlägerhaut Fäden aus Gelatine in den Bruchfack einführt, welche hinreichend sind, daselbst die gewünschte Entzündung herbeizuführen, während die Fäden selbst reforbirt werden. Auf 10 Fälle der auf diese Weise Operirten treffen nach den Angaben von Belmas 5 mit Heilung, 3 mit Recidive und 2 ohne Heilung.

Bei dem Verfahren von Bonnet wird nach demselben Prinzip die Obliteration des Bruchfackes mit Hilfe von Nadeln bewirkt, die quer durch seine Wandungen hindurch geführt werden. Bei Ausführung der Operation muß vor Allem die Hernie reponirt werden. Nach gelungener Taxis faßt der Operateur die Wurzel des Scrotums so, daß er den Samenstrang mit zwei Fingern aufhebt, und schiebt dann eine starke Nadel durch, welche an ihrem Kopf mit einem abgerundeten Korkstückchen armirt ist, sodann wird ein zweites gleiches Korkstückchen an der Nadelspitze angesteckt und dem ersteren soweit entgegengeschoben, daß die auf der Nadel ruhenden Weichtheile zwischen den beiden Korkstückchen ein wenig comprimirt werden. Um das Abgleiten der Korkstückchen zu verhindern, wird das spitze Ende der Nadel mit einer Pincette aufgerollt. Hierauf wird eine zweite Nadel etwas höher oben aber über dem Samenstrang eingestochen und dann ganz so wie die erste angebracht. Nach 4—5 Tagen tritt gewöhnlich eine reaktive Entzündung auf, zwischen dem 6—12 werden die Nadeln entfernt und innerhalb eines Zeitraumes von 3—4 Wochen soll die Obliteration des Bruchfackes erfolgen.

Subcutane Scarificationen des Bruchfackes wurden nach dem Vorgange von Velpeaux von verschiedenen Operateuren mit Erfolg ausgeführt. Es war dies eine der Hydrocelen-

operation ähnliche Methode, bestehend in Injektionen von reizenden Substanzen besonders von Jodtinktur (f. o.). Es trat eine entzündliche Verwachsung im Bruchfacke auf und die Heilung erfolgte ohne üble Zustände.

Doch erscheint es sehr zweifelhaft, ob die Beobachtungen hierüber auch lange genug verfolgt wurden, und ob nicht, wie dies bei anderen Verfahren ja auch der Fall war, nach Verlauf eines gewissen Zeitraumes die Adhäsion sich wiederum gelöst und der Bruch von Neuem herabgetreten ist.

Zu erwähnen ist hier noch Moefners Setaceum (Haarfeil) von Seide. Mit einer Nadel, welche einen Spitzendecker hat, wird ein doppelter Faden durch den Leistenkanal gezogen und bleibt als Setaceum liegen, wird sogar mehrere Tage täglich etwas hin- und hergezogen bis üppige Granulationen durch diesen Reiz erzeugt werden, dann aber nimmt man den Faden weg und legt eine comprimirende Epucè regenerativ an, um die granulirenden Flächen zur adhäsiven Verwachsung zu bringen, was fast immer gelingt, aber nie lange dauert, da solche Bindegewebsmassen, die durch den reizenden Faden erzeugt werden, wieder gänzlich resorbirt werden und der Kanal neuerdings durchgängig wird.

Während die oben erwähnten Verfahren sammtlich darauf ausgingen durch Verödung des Bruchfackes eine Radicalheilung zu erzielen, kam durch Gerdy (1840) eine neue Methode, die als Invagination bezeichnet wurde und in vielfachen Modificationen Anwendung gefunden hat und wesentlich nur für Leistenbrüche verwendet werden kann. Der Gedanke war der, daß nicht dadurch, daß im Bruchkanale die Absetzung eines plattischen Exsudates bezweckt werde, ein Hervordringen der Eingeweide unmöglich gemacht werde, sondern nach seiner Idee sollte der Bruchfack geschont und die Entzündung, soviel als möglich, auf die allgemeine Bedeckung beschränkt bleiben. Die Heilung sollte lediglich durch eine mechanische Verstopfung des Bruchkanals und der Bruchpforte zu Stande kommen. Es

war die Absicht Gerdy's aus dem Körper des Patienten selbst gewissermaßen eine Pelotte zu bilden dadurch, daß die Scrotalhaut in Form eines Blindfackes durch den Leistenring in den Leistenkanal eingefülpt und dort einen organischen Pfropfen, zum Verschluss dienend, bilden sollte.

Die Operation wurde folgendermaßen ausgeführt:

Der Operirende stülpt mit dem linken Zeigefinger die Scrotalhaut durch den Leistenring ein, darauf acht gebend, daß der Samenstrang nach hinten zu liegen kommt. Sodann wird auf der Vorderfläche dieses Fingers das von Gerdy angegebene Instrument eingeführt, nemlich ein Stilet, welches durch eine Metallhülse gedeckt ist und mittelst eines Druckes hervorbewegt werden kann. Dieses Stilet nun wird bis an den Grund des gebildeten Blindfackes eingeführt, sodann der Stachel desselben vorgehoben und dadurch der eingefülpte Kegel das ist die vordere Wand des Leistenkanals und die Haut des Unterleibes von innen nach außen durchstoßen. Jetzt wird ein Fadenbändchen eingefädelt, der Stachel zurückgehoben und circa $2\frac{1}{2}$ cm weit vom ersten Ausstichpunkte entfernt neuerdings durchgestoßen. Jedes Fadenende wird an einem Heftpflasterstäbchen festgebunden und so eine Art Zapfen-naht gebildet, durch welche die eingefülpte Scrotalhaut im Leistenkanal vorläufig mechanisch festgehalten wird, während der Kegel später durch die entzündliche Reizung der Fäden verwuchs und der definitive Verschluss durch die plastische Ausschwitzung erfolgen soll. Zur Beschleunigung dieses Zweckes geht Gerdy nach vollendeter Operation mit einem in Aetzammoniak getauchten Pinsel in den Blindfack ein, um auch die Epidermisfläche desselben in eine entzündliche Reizung zu versetzen und die Bildung eines Granulationsgewebes zu erzielen. Wenn nach Verlauf von 6—8 Tagen die Nähte entfernt werden, soll eine solide Verwachsung der Scrotalhaut in den Leistenkanal erfolgt sein.

Es wird hierauf noch ein einfacher Compressionsverband an-

gelegt zum Schutze der neuen Adhäsionen und der Kranke einige Wochen in horizontaler Rückenlage im Bett gehalten.

Wenn man das Verfahren von Gerdy einer genaueren Kritik unterwirft, so stellt es sich heraus, daß dadurch entweder gar keine oder doch nur ganz vorübergehende Resultate erzielt wurden. Im günstigen Falle konnte es bei dieser Operation einmal gelingen, daß man wirklich einmal einen Theil des Bruchfackes mit dem Finger nach dem Leistenkanal hineinstülpte und somit einen wenigstens temporären Verschluss erzielte. In der Mehrzahl der Fälle aber blieb der Bruchfack von dem vordringenden Finger unberührt, so daß nur Haut und accessorische Hüllen in den Bruchfack hineingeschoben wurden. Dann war zwar die Gefahr einer Verletzung des Peritoneums gering, allein der Erfolg auch kein zufriedenstellender. Bei großen Brüchen aber mit weiter Bruchpforte hält die Naht allein den Bruch nicht zurück.

Aus diesen Gründen konstruirten Wutzer und späterhin Rothmund besondere Instrumente sogenannte Invaginatoren in Verbindung mit einem fixirenden Nähapparat zu dem Zwecke, um den eingestülpten Kegel auch bei großen Brüchen mit weiter Bruchpforte während der zur Verwachsung nöthigen Zeit zurückzuhalten. Ebenso erfand M. Langenbeck einen ähnlichen Apparat in gleicher Absicht. Näheres über die von Wutzer und Rothmund auf obige Art Behandelten liegt nicht vor, nur theilt Busch mit, daß er nach längerer Zeit von den durch Wutzer Genesenen, welche er zufällig untersuchte, 3 wieder mit Hernien behaftet fand.

Da man sah, daß die Invaginations-Methode bessere Resultate hat, wenn ein Stück der Scrotalhaut brandig gedrückt wurde und eine feste Narbe entstand, so hatte Valette seine Deckplatte gefenstert und in dieses Fenster ein Aetzmittel hineingelegt, so daß ganz sicher Gangrän eines Stückes Haut und feste Vernarbung entsteht.

In den 50iger Jahren wurde von Wood noch ein

weiteres Verfahren versucht. Derselbe machte einen kleinen Hautschnitt durch die Haut des Scrotums und invagirierte $1\frac{1}{2}$ Zoll unterhalb der crista pubis die Fascie in den Leistenring. Von hier aus wird mit einer gestielten Nadel ein Faden oder ein verfilberter Kupferdraht mit 3 Stichen so geknüpft, daß die zwei Pfeiler und die Wandungen des Leistenkanals in Berührung gebracht wurden. Dadurch soll eine Annäherung der Seiten des Kanals und damit ein Verschluss desselben bewirkt werden. Es wird angegeben, daß von 67 auf diese Weise Operirten 32 sicher geheilt wurden von 160 so Behandelten starben 2. *)

Ganz ähnliche Operationen, wie die erwähnten wurden von englischen und amerikanischen Chirurgen: Dowel, Crisholm, Fayres u. A. vorgenommen.

Prüft man nun unbefangen alle eben angegebenen Methoden, so wird man zugeben müssen, daß eine Radicalheilung dadurch nicht oder nur in ganz seltenen Fällen erzielt wurde. Es sind ja alle Verhältnisse der Wiederentstehung des Bruches günstig, der Exspirationsdruck, die Schwere und die sehr gerne eintretende Atrophie der Verklebungen seröser Häute.

Alle Bindegewebsmasse und Granulationen, welche künstlich erzeugt sind, werden in der Folge gewöhnlich schnell wieder resorbirt, so daß alle Erfolge, welche auf künstlicher Granulation und Adhäsion beruhen, meist von sehr kurzer Dauer sind. Dieses Loos trifft alle diese Radicaloperationen von Wutzer, Rothmund, Gerdy, Möfner etc., denn bei allen beruht sie auf künstlicher Adhäsion.

Dagegen ist statt der erhofften Heilung in einzelnen Fällen das Unglück eingetreten, daß die Entzündung, welche man im Bruchsack absichtlich gesetzt und angestrebt hatte, sich über die gewünschten Grenzen hinaus fortpflanzte und durch Auftreten einer Peritonitis den Kranken dem Tode nahe

*) König Lehrbuch der speziellen Chirurgie II. Berlin 1879.

brachte, der nicht selten die Folge der Operation war. Allerdings waren die Fälle, wenn die mit Recht gefürchtete Peritonitis glücklicherweise nicht eingetreten war, nach einer Behandlung von ungefähr vier Wochen als radical geheilt entlassen worden.

Die Operirten konnten in jeder Weise ihre Bauchpresse anstrengen, ohne dafs dadurch der Bruch wieder zum Vorschein gekommen wäre. Allein die Freude über die gelungene Genefung sollte in der Regel nur eine kurze sein, denn das künstlich hervorgerufene Granulationsgewebe wurde resorbirt und nach einem halben Jahre erschien der Patient mit seinem frühern Bruche behaftet wieder beim Operateur, abgesehen von den Fällen, die sich der Beobachtung ganz entzogen und von denen viele wieder ihr altes Leiden bekamen.

Jetzt geht man in folgender Weise vor: Wenn ein mobiler Bruch bei einfacher Rückenlage nicht zurückgeht, so nimmt man vor der Anlegung eines Bruchbandes die Taxis vor d. h. man drängt den Inhalt des Bruchfackes in die Unterleibshöhle zurück. Man fafst die Bruchgeschwulst an ihrem Grund in die volle Hand, comprimirt dieselbe leicht und schiebt hierauf mit den Fingern der andern Hand zu gleicher Zeit die der Bruchpforte zunächst liegenden Gegenstände zurück. Dabei ist ganz besonders darauf zu achten, dafs nicht etwa leere Dünndarmschlingen zurückbleiben, was leicht geschehen kann, indem sich diese ähnlich anfühlen, wie im Bruchfack, der natürlich nicht reponirt wird. Ist nun die Taxis gelungen, so wird ein Bruchband angelegt.

Es dürfte hier wohl am Platze sein, Einiges über die nothwendigen Eigenschaften eines guten und wirklich brauchbaren Bruchbandes zu erwähnen, weil es für den Arzt von der grössten Wichtigkeit ist, zu wissen, wie ein solches beschaffen sein mufs, um dem Bruchkranken zu nützen, da die Unkenntnifs in dieser Richtung leicht grossen Schaden stiften kann. Dasselbe besteht aus Pelotte, Feder und Befestigungsriemen.

Das Hauptaugenmerk ist auf die elastisch federnden Bänder zu richten. Hierüber wurden im vorigen Jahrhundert von P. Camper Angaben gemacht und die Grundbedingungen sind noch heute dieselben, wenn auch im Laufe der Zeit die verschiedenartigsten Modificationen eingeführt wurden. Der Zweck des Bruchbandes aber ist der, die beim Gehen, Stehen, Reiten u. f. w. herabtretenden Eingeweide zurückzuhalten. Es muß also der Verband, welcher die Pforte bei solchen Verhältnissen wirksam gegen den Andrang der Eingeweide verschließen soll, derartig eingerichtet sein, daß er genau an den Stellen der Bruchpforte anliegt und zwar mit solcher Kraft, daß er nicht nur in der Ruhe, sondern auch bei allen Momenten, welche ein stärkeres Hervordringen herbeiführen, den gehörigen Widerstand leistet, ohne daß die verschiedenen Körperbewegungen im Stande sind, eine Verschiebung zu bewerkstelligen. In dieser Absicht hat man die sogenannte Pelotte des Bruchbandes erfunden, welche die Bruchpforte um ein Weniges überragen soll, und mit derselben genügend starke Federn in Verbindung gebracht.

Die Pelotte hat je nach der Form der Bruchpforte und der umgebenden Theile eine verschiedene Gestalt, bald ist sie rund, bald mehr elliptisch, bald oval und ist meist aus starkem Eisenblech gefertigt und gut gepolstert. Es gibt auch solche, die aus Holz, Elfenbein und ähnlichen Stoffen dargestellt werden. Letztere sind aber insofern nicht gut, als sie wegen ihrer Härte zu sehr auf die Weichtheile drücken. Werner empfiehlt Pelotten aus vulkanisirtem Kautschuck, welche sich ganz gut gebrauchen lassen.

Die Feder ist ein sehr wichtiger Bestandtheil und wird aus verschiedenen federnden Metallen hergestellt, meistens ist sie von Stahl. Die Kraft der Feder, welche den Bruch zurückhalten soll, wird so verwendet, daß das vordere Ende (Kopfende) mit der Pelotte gegen die Bruchpforte drückt, während das hintere Ende (Schwanzende) sich gegen das

Kreuzbein anlehnt. Am besten ist es, wenn die Feder nur an diesen zwei Punkten dem Körper direkt anliegt und im Uebrigen denselben nicht berührt. Der Durchmesser zwischen den beiden Stützpunkten beträgt beim Erwachsenen durchschnittlich 7—8 Zoll. Die Stärke der Feder kann man in der Weise bestimmen, daß sie am Schwanzende fixirt wird, während man am Kopfende Gewichte befestigt. Leichtere Hernien repräsentiren eine Kraft von 2 Pfund, schwerer zurückzuhaltende ein solches von 3—4 Pfund.

Die Pelotte ist mit der Feder in verschiedener Weise verbunden. Nach dem Engländer Salmon durch ein Nussgelenk, welches gestattet, daß der Bruch den Bewegungen des Körpers folgt, was besonders bei Schenkelbrüchen nöthig ist, nach Calles ist die Verbindung durch eine Spiralfeder vermittelt, wodurch die Beweglichkeit eine geringere wird. Es ist darauf zu achten, daß die Feder, soviel als möglich, gegen die Richtung wirkt, in welcher der Bruch drückt also thunlichst im Centrum der Pelotte befestigt ist, weil außerdem der Widerstand sehr vermindert wird.

Zur Vermeidung von Verschiebungen ist am Schwanzende ein Riemen befestigt, welcher um die freie Beckenhälfte herumgeht und an der Pelotte eingeknüpft wird. Sogenannte Schenkelriemen vom Rückentheile des Bandes zwischen den Beinen hindurch nach dem Pelottentheile zu sollen letzteren festhalten, thun dies aber nur unvollkommen und sind daher nur an schlechten Bruchbändern angebracht. Die französischen spiralig verlaufenden, Bruchbänder gehen auf der kranken Seite bis zur Hälfte des Beckens oder auch ein wenig darüber hinaus, die englischen, gerade verlaufenden reichen bis auf die gesunde Seite des Kreuzbeins und endigen dort mit einer breiten Pelotte. Dieselben sind den ersteren wegen ihrer kräftigeren Wirkung vorzuziehen.

Bruchbänder ohne Federn, wie sie jetzt öfters wieder fabrizirt werden, sind offenbar ein Rückschritt und passen nur

für ganz wenige Fälle. Welchen Werth die federnden Bandagen haben, das beweist die Geschichte der Radical-Operationen. Als die federnden Bänder aufkamen, hörte man ganz auf, gefährliche Radical-Operationen zu machen. Erst in der neuesten Zeit, wo diese Operationen nahezu ohne Gefahren ausgeführt werden können, spricht man wieder zu ihren Gunsten.

Es gibt auch doppelte Bruchbänder für beiderseitige Brüche, welche hinten durch einen Gurt verbunden sind, und diese werden in neuerer Zeit öfters zur Zurückhaltung von schwereren Hernien verwendet, obgleich die Wirkung der Pelotte auf der gefunden Seite nachtheilig werden kann.

Manche tragen Bedenken bei Kindern frühzeitig ein Bruchband anzulegen aus Furcht vor Excoriationen und Eczemen, die nicht selten in der Nähe des Bruchbandes entstehen. Allein es läßt sich durch Vorsicht, also gute Polsterung und Ueberzug von wasserdichtem Zeug und ähnlichen Mafsregeln Vieles vermeiden. Sind aber schon Uebelstände eingetreten, so lassen sich dieselben durch einfache Behandlung der betreffenden Theile leicht beseitigen. Für das Anlegen eines Bruchbandes auch in frühester Zeit spricht die Thatfache, dass bei Kindern und jugendlichen Individuen durch eine Jahre lang fortgesetzte Compression, welche durch ein gut construirtes Bruchband am Besten zu erreichen ist, die Bruchpforte sich nach und nach verengern und durch eine partielle, feltener totale Adhäsion zum Verschluss gelangen kann. Am häufigsten ist dies bei Nabel und Leistenbrüchen zu beobachten. Auch ist der Eintritt von Einklemmungen in frühem Alter durchaus kein seltenes Ereigniß. Bei einem Alter von über 30 Jahren ist jedoch das Tragen eines Bruchbandes nur ein palliatives Mittel und nur in sehr seltenen Fällen kommt es noch später zu einer Radicalheilung. So führt Malgaigne einen Fall an, wo er einen 78 Jahre alten Mann durch einfache Compression von einem Leistenbruche radical heilte.

Das einmal angelegte Bruchband soll wenigstens am Tage beständig getragen werden, weil sich ein derartig zurückgehaltener Bruch beim Hervortreten leicht einklemmt. Es soll daher jeder Bruchkranke ein Reservebruchband haben, um sofort etwaige Störungen im Tragen umgehen zu können. Wird auch bei der Nacht das Bruchband getragen, so ist es um so besser, weil einmal die Rückenlage, in welcher der Bruch allein zurückbleibt, viele Unannehmlichkeiten mit sich bringt und es andererseits leicht denkbar ist, daß der Bruch bei Körperbewegungen, Husten u. s. w. hervortreten muß. Außerdem können es die meisten Menschen bei gut sitzendem Bruchband schnell angewöhnen, auch Nachts daselbe zu tragen.

Man benützt auch noch theilweise ausgehöhlte Pelotten bei nicht ganz reponibeln Hernien, wenn man absehen will von einer Radiacalheilung durch Herniotomie. Die wahrhaft glänzenden Erfolge der antiseptischen Behandlung verdrängen diese Art mehr und mehr.

Ist nun nicht möglich, einen Bruch meistens wegen bestehender Verwachsungen zu reponiren, so ist naturgemäfs dieser Zustand, wie schon hervorgehoben, viel gefahrdrohender durch Kotheinklemmung (fog. Engouement) und die verschiedensten Störungen der Darmfunktion bei Verwachsungen, Achsendrehungen, Knickungen der Eingeweide, Incarceration Entzündungen etc. Roser glaubt fogar, daß durch einfaches Andrängen eines Netzknollens fogar bei mobilem Bruch eine ventilartige Einklemmung entstehen kann. In diesem Falle muß alles versucht werden, um diesen Zustand zu beseitigen. Die Kranken müssen mit erhöhtem Becken im Bette liegen und eine sehr strenge Diät halten. Von Zeit zu Zeit werden Repositionsversuche gemacht, doch muß man dabei besonders bei Greisen mit großen Brüchen vorsichtig sein. Bei Verwachsungen des Netzes versucht man oft noch durch Auflegen von Eisbeuteln oder Sandfäcken auf die Bruchgegend die Taxis zu unterstützen.

Ist nun all' diese Anstrengung vergeblich, so entsteht die Frage nach einer Radicaloperation. Da nun zeigt es sich im hellsten Lichte, wie segensreich die Antiseptik wirkt. Die große Reform in der Chirurgie, welche von Lister ausging, der wie ein Herkules die vielköpfige das Verderben der Pyämie, Septicaemie, Erysipelas, Lymphangitis aushauchende Hydra bezwang und unschädlich machte, hob die Muthlosigkeit, welche die schonsten und geschicktesten Operationen als nutzlos oder wenigstens in höchstem Grade gefährlich erscheinen liefs. Erst jetzt wagte man es wieder mit neuer Kraft und Energie an das große Werk zu gehen. Diesmal können wir getrost behaupten, dafs ein günstiges Resultat dem Bemühen folgte.

Es war im Vaterlande des großen Reformators selbst, wo man zuerst daran ging, die Wohlthaten des neugefundenen Verfahrens auch den armen Bruchbehafteten zu Theil werden zu lassen. Steele ist der erste in der Reihe dieser großen Männer. Er veröffentlicht in einem Artikel: *On operations of the radical cure of hernia. The med. Brit. Journ. 1874 Nr. 7* seinen ersten Fall. Das Verfahren, das er hierbei eingeschlagen hatte, bestand darin, dafs er die beiden Leistenpfeiler wund machte und durch zwei Catgututuren vereinigte, ohne dafs er dabei den Bruchfack selbst in das Bereich des Operationsfeldes gezogen hätte. Die Heilung ging gut von Statten, doch nach 6 Monaten trat Recidive ein. Es war nämlich plötzlich der Bruch wieder herabgetreten und incarcerirt worden. Die eingeklemmte Darmschlinge wurde nach vorausgegangener Punction und Entleerung des Bruchfackes reponirt und die Operation so, wie das erste Mal wiederholt. Nach Heilung der Wunde wurde ein Bruchband angelegt und nach Verlauf eines Jahres hatte sich keine fernere Erweiterung der Leistenöffnung constatiren lassen.

Ermuntert von diesem günstigen Erfolge unternahm

Annandale*) ebenfalls Versuche in dieser Richtung. Seine Fälle betrafen eine hernia scrotalis und inqualis, die zwar beide reponibel waren, allein durch kein Bruchband zurückgehalten werden konnten. Der Bruch sack wurde bloßgelegt und möglichst hoch oben mit Catgut eine Ligatur um denselben angelegt. Dabei wurden die Bruchsäcke nicht entfernt, wohl aber ereignete es sich, daß der Bruch sack der hernia femoralis in die Bauchhöhle glitt.

Zu derselben Zeit wie Annandale erfand auch der um die Verbreitung der Lister'schen Ideen hochverdiente Professor v. Nufsbaum**) ein neues Verfahren zur radicalen Heilung von Hernien. Es handelte sich hier um ein paar Fälle, wo das Bruchband nicht im Stande war, die Hernie in genügender Weise zurückzuhalten und eine Operation daher gewünscht und gerechtfertigt erschien. Dieselbe wurde unter den minutiösesten antiseptischen Cautelen ausgeführt. Schon Tage vorher wurde das Operationsfeld wiederholt abgefeist und Umschläge mit 2½ proz. Carbol säurelösung gemacht, die Haare durch Rasiren entfernt. Der Darm wurde durch ein Abführmittel feines Inhaltes entleert und einige Tage vorher nur wenig kothmachende Speisen verabreicht. Die nöthigen Instrumente lagen 24 Stunden vorher in Carbol säurelösung, kurz es waren die genauesten antiseptischen Maßregeln in jeder Hinsicht genommen. Kurz vor der Narcofe wurde nochmals die Gegend, in welcher die Operation vorgenommen werden sollte, mit 5proz. Carbol säurelösung gereinigt, nachdem vorher mit warmem Wasser, Seife, Handtuch und Bürste aller Schmutz entfernt war. In neuerer Zeit nimmt v. Nufsbaum zum Reinigen der Haut nie mehr Seife, weil selbe ihm von Lister mißrathen wurde, indem die Seife oft selbst Fäulnißerreger enthalte.

*) Edinburg med. Journ. June 1877.

**) Bildung eines künstlichen Harnleiters, nebst einer vorläufigen Mittheilung über Heilung der Hernien. München 1876.

Das Abreiben der schmutzigen Haut mit 5 proz. Carbolsolution genügt vollkommen. Die Carbonsäure geht mit aller fetten Schmiere Emulsionen ein. Hierauf wurde die Chloroformnarkose eingeleitet und nach eingetretenem Stadium der Toleranz unter den Regeln der Antiseptik die Operation begonnen. Es wurde ein Hautschnitt gemacht, welcher die Bruchpforte und den oberen Theil des Bruchfackes freilegt, je nach Verhältniß 5—10 cm lang ist und in der Richtung des Bruches zur Mitte desselben und der Bruchpforte geht. Hoden und Samenstrang werden vom Bruchfack lospräparirt und die blutenden Gefäße möglichst rasch unterbunden. Der Inhalt des Bruchfackes wird reponirt und derselbe möglichst hoch oben am Hals mit einem starken Catgutfaden fest zugenäht, aber so, daß der Samenstrang nicht mitgefaßt wird. 1 cm weit unterhalb der Naht wird dann der ausgeleerte Bruchfack weggeschnitten, die zugenähte Partie möglichst weit in den Unterleib hineingefchoben und sodann auch die Scrotalwunde nach den Regeln der Antiseptik verschlossen. v. Nufsbaum macht also eigentlich wieder die längst verlassene alte Radicaloperation der goldenen Naht oder Königsnaht. Diese früher so lebensgefährliche Operation ist aber jetzt durch Benützung der Antiseptik gefahrlos ausführbar. Als Naht wurden hierbei sogenannte Hinterstiche benützt, welche sich zur Vereinigung zweier glatter Stücke am Besten eignen. Der Verlauf war ein durchaus gefahrloser und das Endresultat ein sehr zufriedenstellendes. Keine der im Spital zu München sonst so sehr gefürchteten accidentellen Wundkrankheiten störte das gute Befinden. Geradezu überraschend aber war der Schlusserfolg, indem sich schon während der Heilungszeit Bruchpforte und Bruchkanal bedeutend verringerten.

Von nun an war der Weg zu neuem Handeln gebahnt und es folgen nun in rascher Reihenfolge Veröffentlichungen über die wohlthätige Operation.

Zunächst sind es die Beobachtungen von Czerny*), welcher, nachdem Steele den ersten Versuch gemacht hatte, nach antiseptischen Grundsätzen die Bruchpforte mit Catgutnaht zu verschließen, Anlaß nahm, die Naht der Bruchpforte angelegentlichst zu empfehlen. Die Operation besteht darin, dass er den Bruchsack durch den gewöhnlichen Schnitt bloslegt und den Hals möglichst zu isoliren trachtet. Sodann wird derselbe mit Catgut fest unterbunden und der Bruchsack unterhalb der Ligatur abgeschnitten. Der Verschluss der Bruchpforte wird mit gekreuzter Miedernaht erreicht. Man näht nämlich mit Catgutfaden, welcher in zwei gekrümmte Nadeln eingefädelt ist und durchsticht jeden Schenkel am Leistenkanal von innen nach ausen. Man legt je nach der Weite 2—5 Nähte an und schneidet sie kurz ab. Nachdem man noch für den gehörigen Abzug des Wundsekretes gesorgt hat durch gut befestigte Drainageröhren, wird die Wunde bis auf die dafür erforderliche Oeffnung geschlossen. Dann wird das Operationsfeld mit Carbolsäure wohl gefäubert, das Blut abgewaschen und mittelst Carbolgaze ein Verband angelegt, welcher alle die Wunde umgebenden Theile kräftig komprimirt. Dann kommt der eigentliche Listerverband nach den allgemein bekannten Regeln.

Später**) wurde das Verfahren so modificirt, dass der Bruchsack nicht abgetragen, sondern die Bruchpforte mit drei isolirten Knopfnähten verschlossen wurde. Eine Abtragung der Ränder des Leistenringes glaubt Czerny nicht ausführen zu müssen. Wenn der Bruchsack wegen Verwachsung oder in Folge anderer Repositionshindernisse der innen liegenden Eingeweide geöffnet werden musste, so wurde er mit 5proz. Carbolsäurelösung ausgewaschen, eine Drainage eingelegt und die Hautwunde durch Catgutnähte vereinigt. — Mittheilungen

*) Wiener medicinische Wochenschrift 1877 Nr. 21—24.

**) Beitrag zur operativen Chirurgie. Stuttgart 1878.

über verschiedene Behandlungsweisen bei versuchter Radicaloperation von sieben Fällen reponible Leistenhernien betreffend macht Riesel*). Der bloßgelegte Bruchfack wurde isolirt und dann entweder eingestülpt und in dieser Lage durch mehrere fein Lumen durchsetzende Catgutnähte festgehalten oder er wurde abgeschnitten, so daß der Stumpf in der Tiefe verschwand oder endlich es wurden nach Eröffnung des Bruchfackes die Ränder derselben vernäht, in einigen Fällen wurde der Verschluss durch die Naht bewerkstelligt.

Schede**) veröffentlicht seine Beobachtungen über acht Radicaloperationen. Dieselben wurden theilweise bei incarcerirten Hernien in Anwendung gebracht und zwar befinden sich darunter eine hernia ventralis und eine hernia femoralis. In 5 Fällen wurde der Bruchfack weggeschnitten, in zwei Fällen die Bruchpforte vernäht.

Bei all' den letzterwähnten Operationen ist in Folge der minutiösen Befolgung der Lister'schen Cautelen kein einziger Todesfall durch accidentelle Wundkrankheiten vorgekommen. Ob die Operationen wirklich radical genannt werden können, läßt sich da das Material ja denn doch noch nicht genugsam bekannt ist, mit voller Bestimmtheit zur Zeit noch nicht angeben, jedenfalls dürften aber die Verfahren, bei denen der Bruchfack extirpirt wird, mehr Aussicht auf eine radicale Heilung beanspruchen.

Es bleibt nun noch übrig, speziell über die Behandlungsweise der incarcerirten Brüche einiges zu erwähnen. Hierüber macht E. Albert in seiner Diagnostik der chirurgischen Krankheiten folgende treffende Einleitung:

„Wenn ich von dem Muthe eines Chirurgen erzählen höre, wenn gesagt wird, er habe Erfolge, denn er wäge auch etwas, — dann wünsche ich mir den Mann zu sehen, wie er sich

*) Börner deutsche medicinische Wochenschrift Nr. 38 u. 39. 1877.

**) Chirurgisches Centralblatt 1877. Nr. 77.

einem Falle gegenüber stellen würde, in welchem incarcerationähnliche Erscheinungen und zugleich eine oder einige irreponible Hernien an dem kranken Individuum zur Beobachtung kommen. Ob er dann den Muth haben wird, zu sagen: Keine von den Hernien ist incarcerirt und ich mache keine Herniotomie. Zur Ausführung einer noch so eingreifenden Operation gehört heutzutage kein Muth mehr, zur Unterlassung einer lebensrettenden Operation gehört ein Muth der Ueberzeugung, welcher nur aus den gediegensten Beobachtungen und aus sehr genauer Combination geschöpft werden kann.“

In zweifelhaften Fällen ist es gerechtfertigt und sogar geboten, wenn durch aufmerksame Untersuchung eine Incarceration auch nicht ganz bestimmt sich erkennen läßt, die Symptome aber ernstlicher Natur werden, durch operative Eingriffe Hilfe zu schaffen.

Zuerst ist nun der Versuch, die Eingeweide zu reponiren bei eingeklemmten Brüchen entschieden indicirt, es sei denn, daß man befürchten muß, den Darm durch die Taxis zu zerreißen, oder wenn derselbe bereits eine Zerreißen erfahren hat, was sich durch das Vorhandensein von Schwellung, Röthung und Emphysem erkennen läßt. Die Zerreißenbarkeit ist nach Schede anzunehmen, wenn reichliches Bruchwasser vorhanden ist, was für starke Blutstauung und starke seröse Durchtränkung mit größerer Zerreißenlichkeit des Darmes spricht.

Einige Autoren sprechen sich für eine forcirte Taxis aus, so in Frankreich Amusat, Goffelin, in Belgien Thiry, in Deutschland Streubel und in neuerer Zeit auch Schede, der jedoch entgegen den Uebrigen die forcirte Taxis nur auf eine Viertelstunde längstens ausgedehnt wissen will. Doch sind die meisten Chirurgen, wenigstens in Deutschland, damit nicht einverstanden wegen der Gefahr des Sprengens des Darmes oder dem Vorkommen einer oft nur scheinbaren Reduktion.

Nach „v. Nufsbaum“ ist die richtigste Regel für die Taxis folgende:

Bei großen, schmerzlosen Brüchen ist eine lange dauernde forcirte Taxis erlaubt und selbe einer Herniotomie vorzuziehen.

Bei kleinen, schmerzhaften Hernien, welche relativ viel Bruchmasse enthalten, ist nur eine sanfte kurze Taxis zu versuchen und die Herniotomie viel gefahrloser als die Taxis. Das entzündete Darmgewebe perforirt zu leicht.

In neuerer Zeit sind besonders in Frankreich feine Punktionen des mit Luft und Koth prall gespannten Darmes versucht und öfters wiederholt werden von Dyplong, Dolbeau, Demarquay mit Hilfe des Apparates von Dieulafoy. Eine Nadel wird eingeführt und Gas und flüssiger Inhalt durch Aspiration (Punction aspiratoire) entleert, wodurch in einzelnen Fällen ein Zusammenfallen der Bruchgeschwulst und somit die Möglichkeit der Reposition gegeben wurde. Allein so verführerisch und ungefährlich diese kleine Operation erscheint, so ist es doch unzweifelhaft, daß bei späterer Anwendung dieses Verfahrens, bei enger Bruchpforte, welche frühzeitige Gangrän des Darmes begünstigt (Doutrelepout), Perforation und tödtliche Peritonitis die unliebfame Folge sein können.

Kocher verlangt deshalb mit Recht, diese einfache Behandlungsweise auf die Fälle zu beschränken, in denen die Kranken nach vergeblichem Versuche der Taxis jede blutige Operation entschieden zurückweisen.

Ist nun die Taxis, welche in der Chloroformnarcose im Stadium der vollständigen Erschlaffung aller Muskeln ausgeführt werden soll, nicht gelungen, so schreitet man zur Herniotomie:

Die Gefahr hierbei wird besonders herbeigeführt durch die bei Spaltung des Bruchfackes stattfindende Eröffnung der Bruchhöhle. Das war den Chirurgen schon zur Zeit von Franco klar und man wollte daher die einklemmenden

Bruchpforten durchschneiden und die Reposition machen, ohne daß man das Bauchfell verletzt.

J. L. Petit führte diese Methode ein, wenn er auch mit vielen Widersprüchen zu kämpfen hatte besonders in Frankreich, wo Dupuytren und Malgaigne, und in Deutschland, wo Dieffenbach dagegen auftrat. In England fand seine Operation viele Anhänger so z. B. Cooper, Key, Teyle, Paget u. A., denen sich in Deutschland Rofer, Danzel, Schuh, Busch, Schmidt, Doutrelepout u. A. anschlossen.

Die Ausführung des äußern Bruchschnittes wurde in folgender Weise gemacht:

Der Schnitt verläuft parallel der Längsachse des Bruches und geht je nach dem Fettreichthum oder nach dem Ueberhängen des obern Randes vom Bruch über die Bruchpforte 1—1½ Zoll über letztere hinaus. Dadurch wird die Bruchpforte und der Halstheil des Bruchfackes dem Auge sichtbar gemacht. Nun werden die Bindegewebschichten beim Leistenbruch auf der äußern Mündung des Leistenkanals, beim Schenkelbruch auf dem lig. Poupartii und processus falciformis durchtrennt, die fascia propria (f. fp.) durchschnitten und der obere Theil des Bruchfackes, der an die Pforte grenzt, mit zwei Pincetten gefaßt und blosgelegt. Nach Busch sollte man jetzt den ganzen Bruch aus der fossa propria herauschälen. Er umgeht ihn mit dem Finger und löst ihn aus seinem Bett aus, um die Verhältnisse besser zu übersehen. Ist man nun soweit gelangt, so kann man oft durch Untersuchung mit dem Finger den Sitz der Einklemmung bestimmen. Es gibt sich diese dem Gefühl als eine streng abgesetzte, strang- oder fadenförmige Spannung zu erkennen und der Bruch selbst liegt vor der gespannten Seite. Diese Stelle muß nun durchaus nicht immer zugleich die Bruchpforte selbst sein, sondern es können bindegewebige Schichten, welche die fascia peritonei wie eine Schlinge umgeben, sich finden, nach deren völliger Durchschneidung plötzlich die vorhandene Spannung aufhört und die

Reposition sogleich ermöglicht wird. Deswegen soll man etwaige fühlbare Stränge vor der Bruchpforte durchtrennen, ehe man an die Durchschneidung dieser selbst geht. Die Pforte wird nun von außen nach innen durchgeschnitten (Heffelbach, Key) so, daß man einige Linien über der Bruchpforte zwischen zwei Pincetten einschneidet und allmählig bis zum freien Rand durchtrennt, oder man schiebt eine Hohlsonde ein und spaltet auf dieser. Ist dies geschehen, so werden die weiteren Stränge und Bindegewebefäden, die eine Spannung zeigen, auf dieselbe Weise getrennt. Man muß dabei Sorge tragen, daß die nach Aufhören der Spannung hervorquellende Bruchgeschwulst zurückgehalten wird. Seit der Zeit, als wir die Eröffnung des Peritoneums nicht mehr fürchten, weil wir die gefährliche Abkühlung und die noch gefährlichere Infektion vermeiden gelernt haben, legen wir auf den Petit'schen Bruchschnitt nicht mehr den großen Werth, wie früher; im Gegentheil ziehen wir es fast immer vor, den Bruchsack zu öffnen und die Qualität des Bruchinhaltes zu prüfen, denn der wahre Brucheintritt ist jetzt in nichts gefährlicher, aber viel sicherer. Manche bedienen sich des sog. Roser'schen Hackens, der mit seinem stumpfen Ende unter die Stränge geschoben und dann senkrecht angezogen wird. Die Stränge werden durch die gegen den Hacken gerichtete Schneide durchtrennt und dann kann man den Bruch durch leichten Druck auf den Bruchsack reponiren.

Die Wunde wird nun am oberen Theil vernäht und unten offen gelassen. König gibt in seinem Lehrbuch der speziellen Chirurgie an, daß auf diese Weise schon nach 8 Tagen die Operirten im Stande waren, aufzustehen und leichtere Arbeiten zu verrichten.

Einzelne Autoren haben die Operation subcutan gemacht, indem sie einen kleinen Schnitt neben dem Bruch machten, mit dem Finger bis zur Einklemmung vorzudringen suchten, die Fingerspitzen dann hackenförmig umbogen und

die Bruchpforte hierauf mit den Fingerspitzen oder ev. mit dem stumpfen Hacken zerrissen und nur ausnahmsweise das Bruchmesser verwendeten, so in Frankreich Guérin, Bouchut, bei uns M. Langenbeck. Der Hauptnachtheil liegt darin, daß man keine klare Einsicht bekommt und dabei die Wunde doch ziemlich groß ausfallen muß, um genügend vordringen und operiren zu können. Außerdem hat ja die subcutane Operation bei der Ungefährlichkeit der antiseptischen Methode gar keinen Werth.

Gelingt es nun nicht durch die herniotomia externa den Bruch zurückzubringen, so muß man zur Herniotomie mit Eröffnung des Bruchfackes selbst greifen. Es ist nun hier die äußerste Vorsicht durch strengste antiseptische Operationsausführung nothwendig, da es sich um die Eröffnung der Unterleibshöhle handelt. Man macht den Hautschnitt anfangs nicht zu groß, besonders bei großen Brüchen, das obere Ende überragt die Bruchpforte um etwa $\frac{1}{2}$ Zoll. Dann kommt die Durchtrennung der weitem Schichten in derselben Richtung und Ausdehnung, wie der Hautschnitt, zuerst die mit der Haut verschiebbare Fascie. Man hebt eine Falte mit der Pincette in die Höhe, schneidet ein Loch in dieselbe und schiebt die Hohlsonde ein, oder man durchschneidet das Bindegewebe zwischen zwei einander gegenüber aufhebenden Pincetten. Die Venen, welche dabei oft abnorm vergrößert sind, werden vor der Durchschneidung doppelt unterbunden. Auf die Fascie folgt nun ein den eigentlichen Bruchfack umhüllendes derbes Gewebe, dem beim Leistenbruche auch Muskelfasern beigemischt sein können und welches von A. Cooper als fascia propria bezeichnet wird und das er bei Schenkelbrüchen fand, während Linhart auch für die Leisten- und die übrigen Abdominalbrüche dasselbe Verhalten fand. Von dieser Schicht, welche meist stark gespannt ist, wird ein kleines Stückchen frei durch Erheben mit Hackenpincette oder einem kleinen scharfen Hälckchen und die Hohlsonde in die gemachte Oeffnung ein-

gehoben. Auch hier kann man mit zwei scharfen Häkchen statt Pincetten, wie bei der subcutanen Fascie spannen und dazwischen schneiden (diffecirendes Verfahren).

Nun kommt der Bruch sack sehr oft mit der fascia propria mehr oder weniger durch Bindegewebsfasern verbunden vor. Derselbe stellt eine ziemlich glatte, seröse, mit Gefäßen versehene, faltbare Membran dar, wenn nicht durch Adhäsiventzündung Verwachsungen vorliegen oder wegen der bläulichen Färbung durch Compression innerhalb der Bruchpforte eine große Ähnlichkeit mit Darm besteht. Zur Unterscheidung dient, daß der Darm ganz glatt und ohne Fett ist. Hebt man bei Zweifeln ein Fältchen auf, das durchscheinend ist, so ist dies kein Darm. Ist aber der Bruch sack dick, so kann man beim Aufheben und bei Hin- und Herbewegung zwischen den Fingern die glatte Berührungsfläche zweier seröser Flächen spüren, während bei einer Darmfalte das Gefühl ein sammetartiges ist, zugleich ist der Darm dicker und derber, weil auch noch eine mucosa vorhanden ist. Um nun den Bruch sack zu eröffnen, faßt man eine Falte desselben mit der Pincette und schneidet diese flach an, oder eröffnet durch einen Stich, wenn derselbe durch Ansammlung von viel Bruchwasser bläsig hervorgetrieben ist. Nun führt man eine Hohlfonde ein und spaltet, soweit der Schnitt reicht. Sind frische Verwachsungen da, so werden dieselben mit dem Finger oder einer stumpfen Hohlfonde gelöst. Alte Verwachsungen und flächenartig ausgedehnte Anlöthungen läßt man, wenn es nicht gelingt, sie mit der Cooper'schen Scheere leicht zu lösen, theilweise am Darmsitzen bleiben, strangförmige werden mit Scheere und Messer gegen den Bruch zu getrennt.

Früher war die Blutung bei der Erweiterung der Pforte sehr gefürchtet und es wurden daher verschiedene Dilatatorien construirt von: Leblanc, Arnaud, Brünighausen u. A., um damit unblutig zu erweitern. Noch Linhart empfahl den Arnaud'schen Hacken, welcher in die enge Stelle ein-

schoben wurde. Jetzt wird dies Verfahren im Durchschnitt nicht mehr angewendet.

Bevor man die Pforte erweitert, überzeugt man sich, ob keine abnorme Beschaffenheit innerhalb des Bruchsackes besteht und schiebt den Zeigefinger oder den kleinen Finger gegen den Bruchsackhals vor, um den Ort der Einklemmung zu diagnosticiren. Diese gibt sich als eine scharfbegrenzte, kreisförmige, straff gespannte Falte zu erkennen. Es wurde zur Dilatation selbst in älterer Zeit die Hohlfonde und ein geknüpftcs Bistouri verwendet. Da aber bei Gebrauch der Heister'schen Flügelfonde oft der Darm durchstoßen oder mit dem Messer der sich in die Rinne der Hohlfonde hineindrängende Darm verletzt wurde, nahm man davon Umgang und führt nun das Wasser nach dem untersuchenden Finger. Viele benützen ein eigenes Bruchmesser von Cooper, welches eine kurze Klinge und einen konischen Knopf hat, doch genügt ein gerades oder ein klein wenig concaves Knopfmesser vollkommen, wenn man dessen Schneide bis auf einen kleinen Theil mit Heftpflaster umwickelt. Kann man den Zeigefinger in die Bruchpforte einführen und ist genügend Platz da, so führt man auf der Gefühlsfläche des Fingers die Klinge des Messers flach ein bis zu dem spannenden Ring.

Dort wird das Messer um seine Längsachse gedreht mit der Schneide gegen die Einklemmung zu und durch den Druck des Fingers der Einschnitt bewirkt. Hierauf kann man das Messer von Neuem aufrichten und so durch abermaligen Druck den Schnitt erweitern. Nach früherer und jetzt wieder von Vidal empfohlener Methode wird das sogenannte Débridement multiple ausgeführt, welches darin besteht, daß neben dem ersten Schnitt, falls dieser nicht ausgiebig genug ist, etwas entfernt davon ein zweiter angelegt wird nach ganz derselben Manier. Genügend ist die Erweiterung, wenn der Finger neben den Eingeweiden bis in die Bauchhöhle vordringen kann.

Ist soweit alles gelungen, so folgt die Reposition. Der

Darm wird etwas angezogen, durch Druck feines Inhaltes entleert und dann reponirt. Gelingt dies nicht, so muß man neuerdings genau untersuchen, wo das Repositionshinderniß besteht und dann daselbe entfernen. Ist der Druck im Darm so groß, daß alle Versuche, die ihn zurückschieben, mißlingen, so muß man kleine Punktionen mit Aspiration versuchen. Dabei ist zu beachten, daß bei groß bleibender Oeffnung der Darm außen liegen bleiben muß, was aber meistens nicht nöthig wird, weil sich die gemachte Oeffnung sofort wieder schließt, wenn sich der Darm entleert hat.

Ist aber der Darm schon perforirt, so wird die Darmnaht angelegt. Die auf diese Art behandelten Fälle von Girardè, Holm u. A. sind günstig abgelaufen. Es werden auch ganze Stücke excidirt und die gefunden Ränder mit feinen Catgutnähten vereinigt und von den meisten nicht reponirt, sondern an der Bruchpforte mit einer Fadenschlinge festgehalten. Einzelne Operateure loben die Reposition, andere haben in der neuesten Zeit große gangränöse Stücke ausgeschnitten und dann die gefunden Theile durch Naht vereinigt. Je mehr sie ausschnitten, je gesunder die vereinigten Därme waren, desto sicherer war die Heilung. Will man das nicht, so läßt man den perforirten Darm außen liegen, aber der Peritonealsack muß vor Berührung mit Koth geschützt werden, dadurch, daß man den Darm außen fixirt.

Dies geschieht nach alter Weise durch Anlegung der Mesenterialschlinge. Ein Fadenbändchen wird doppelt an 1 cm von einander entfernten Stellen durch das Mesenterium geführt und dessen beide Enden zusammengedreht. Oft ist es zweckmäßig den Darm selbst durch Nähte mit der Haut oder dem Bindegewebe in der Nähe derselben zu befestigen.

Sind im Bruchsacke Netztheile enthalten, welche gesund, nicht verwachsen und nicht entzündet sind, so können diese ohne alles Bedenken zurückgebracht werden; bei Verwachsung wird es durchtrennt und dann reponirt. Hypertrophische

Netzknollen werden einzeln abgetragen, nachdem zuvor durch Unterbindung ihres Stiles die Blutung vermieden ist. Kranke Netztheile sollen nicht reponirt werden, weil sie schädliche Produkte in die Bauchhöhle bringen können. Durch Anwendung der Antisepsis ist es möglich geworden, die Entzündung rasch zu coupiren und ohne Fäulniss die Abstoßung zu bewerkstelligen.

Die früher oft von tödtlichem Ausgange gefolgten Blutungen (Cooper, Hay, Dupuytren, Bayer u. f. w.) der arteria epigastrica beim Leistenbruch und der arteria obturatoria beim Schenkelbruch sind heutzutage weniger zu fürchten. Man comprimirt oder noch besser, man trennt die Weichtheile und unterbindet das blutende Gefäß.

Zur Behandlung irreponibler verwachsener Hernien hatte man in früherer Zeit weiters kein Mittel als das Tragen eines entsprechenden Suspenforiums, wenige und ausschließlich Fleischkost, langes Liegen auf dem Rücken, ofte Abführmittel, Hochstellen des Scrotalbruches, damit die Gedärme nach dem Gesetz der Schwere wieder in die Bauchhöhle hineinsinken und öftere Repositionsversuche. Dies wird manchmal Wochen lang angewendet, um eine verwachsene Hernie zu reponiren und das Tragen eines Bruchbandes zu ermöglichen. Hie und da hatte man auch Bruchbänder mit ausgehöhlter Pelotte in Gebrauch. Das war nun freilich eine geringe, man kann sagen gar keine Hilfe, denn von einer Operation, die eine radicale Heilung allein bringen kann, war keine Rede, und auch für den gewandtesten und geistreichsten Operateur wäre es früher eine Tollkühnheit gewesen, die Pforte zu erweitern, den Bruch abzulösen und zu reponiren, da dies Beginnen unfehlbar mit dem Tode des Operirten endete. Bei Incarceration war daselbe der Fall. Man durfte nur die Pforte erweitern, dadurch die Incarcerations-Gefahr beseitigen, aber nie ablösen, nie reponiren, sonst trat immer der Tod ein. Dieser traurige Zustand änderte sich nach Einführung des Lister'schen Ver-

fahrens wie mit einem Schlage. Jetzt nun, wo man unter dem Schutze der Antisepsis sicher auch die gefährvollste Operation machen kann, ist die einzig richtige Methode, welche auch von Professor v. Nufsbaum mit dem besten Erfolg stets angewendet wird, bei Incarceration der irreponiblen Hernien sofort die Radicaloperation und diese wird, um kurz zu wiederholen folgendermassen gemacht.

Der Kranke wird narkotisiert bis sämtliche Muskeln total erschlafft sind, bei Incarceration allein ohne Verwachsung hierauf Versuch der Taxis, gelingt diese nicht sogleich, so wird die herniotomia externa nach Petit gemacht durch einen Schnitt längs der Bruchgeschwulst, wobei das lig. Poupartii blosgelegt wird. Dann wird noch einmal versucht, zu reponiren. Gelingt dies nun auch jetzt noch nicht, so folgt die herniotomia interna, Bruchsack und Peritoneum wird geöffnet dilatirt und reponirt.

Bei incarcerirten verwachsenen Hernien löst man den Darm vom Bruchsack ab und reponirt ihn. Gerne wird er innen adhärent und bildet Abscesse, die aufbrechen und abheilen. Man soll deshalb bei starken Adhäsionen lieber etwas Zellgewebe an der Adhäsion hängen lassen, als den Darm zu dünn ablösen.

v. Nufsbaum fügt immer nach der schon angegebenen von ihm erfundenen Methode das Zunähen des Bruchsackes hinzu, welcher abgetragen wird.

Oft ist dies eine Radicaloperation, denn eine Recidiva erfolgt in nur etwa 20% der Fälle.

Bei grossen blässen, bereits erweichten, nicht gerötheten und dabei schmerzlosen Hernien braucht man mit der Operation nicht zu sehr zu eilen, weil da immer mehrere Darmschlingen 2, 3, 4 vorliegen, welche bei ihrer Elastizität verhindern, dass Gangrän eintritt. Es kann hier blos Darmverwicklung eintreten. Man kann in diesem Falle warten nach Umständen bis zu acht Tagen. Ist dagegen eine Hernie klein, geröthet

und schmerzhaft, so ist eine möglichst rasche Operation dringlichst geboten, weil hier in wenigen Stunden Gangrän und Perforation eintritt.

Wird die Operation der Hernien wirklich streng nach den Grundsätzen Listers ausgeführt, so sind die Resultate ebenso zufriedenstellend, wie bei andern antiseptischen Operationen auch. Es sind selbstverständlich nicht alle Todesfälle ausgeschlossen, was in der Natur der Sache, später Operation, vorhandener Necrose, Perforation und Peritonitis seinen Grund haben kann.

Aber sie sichert fast vollständig in solchem Grade gegen die von Außen hinzukommenden Ursachen der Peritonitis, welche das grösste Contingent für die Todesfälle geliefert hat, und zwar so, wie man es noch vor kurzer Zeit für ganz unmöglich gehalten hatte.

Und diese Errungenschaft können wir mit Recht, als einen, ja den grössten Triumph der Chirurgen begrüßen.

Zum Schlusse erübrigt mir noch, meinem hochverehrten Lehrer: Professor Dr. J. Nep. Ritter von Nufsbaum, k. b. Generalstabsarzt a. s. etc. etc. für die grosse Freundlichkeit, womit er mich bei vorliegender Arbeit unterstützte, meinen besten Dank auszusprechen.